

# FOB test



[www.okulnikrvaceni.cz](http://www.okulnikrvaceni.cz)



NEJCITLIVĚJŠÍ TEST

## Test na okultní (skryté) krvácení v lidské stolici.

Program sekundární prevence kolorektálního karcinomu - KRCA.  
Hygienické použití s bezkontaktní manipulací se vzorkem.



Bližší informace o produktech a distribuci:  
IVT IMUNO, s.r.o.  
tel.: 585 312 945, fax.: 585 313 871  
e-mail: [objednavky@ivtimuno.com](mailto:objednavky@ivtimuno.com)  
[www.okulnikrvaceni.cz](http://www.okulnikrvaceni.cz)

**INFORMUJTE SE  
U SVÉHO LÉKAŘE**

Kolorektální karcinom (lidově: **rakovina tlustého střeva a konečníku**) je v současnosti jedním z nejčastějších nádorových onemocnění. Nejvíce postiženou skupinou jsou lidé ve věku nad 50 let (**muži i ženy**). Česká republika se dlouhodobě drží na předních místech ve statistice výskytu kolorektálního karcinomu v Evropě. Každý rok je u nás zhoubný nádor tlustého střeva či konečníku zjištěn přibližně u **8000 osob**, přičemž **více než polovina** případů tohoto onemocnění **končí úmrtím**.


**Primární prevence:** cílem je omezit rizikové faktory, které přímo ovlivňují vznik zhoubných nádorů. Spočívá především v úpravě stravovacích návyků a životního stylu (stručně: pestrá strava s obsahem ovoce, zeleniny a vlákniny, snížení konzumace uzenin, červeného masa a výrobků rychlého občerstvení, omezení alkoholu a kouření, dostatek přiměřené pohybové aktivity).

**Sekundární prevence:** cílem je zachytit existenci zhoubných nádorů v časném, plně vyléčitelném stadiu. V případě rakoviny tlustého střeva a konečníku se jedná o tzv. **kolorektální screening** (plošné vyšetření nejvíce ohrožené části populace).


**Úspěšnost léčby lze** v rámci prevence výrazně **zvýšit provedením testu** na skryté (**okultní**) krvácení ve stolici (TOKS/FOBT). Provedení je **jednoduché, zcela bezbolestné a hygienické**. Test umožňuje zjistit přítomnost stopových (mikroskopických) množství krve ve stolici, a tím včas upozornit na onemocnění trávicího traktu (nemusí jít právě o rakovinu tlustého střeva a konečníku, ale např. též o polypy, Crohnovu nemoc, či divertikulitidu).

## FOB test IVT IMUNO®


- **vysoká citlivost** (10 ng/ml)
- **jednoduché a hygienické provedení** (bez kontaktu se vzorkem stolice)
- **rychlý jednoznačný výsledek** (do 5-10 minut)



- **bez nutnosti držet dietu**
- test je určen pro **použití v ordinaci i doma**
- **volně prodejný** bez lékařského předpisu



- **plně hrazen zdravotními pojišťovнами** (od 50 let věku v ordinaci praktického lékaře)



[www.okultnikrvaceni.cz](http://www.okultnikrvaceni.cz)

[www.cestykrovnovaze.cz](http://www.cestykrovnovaze.cz) - informace o alternativních cestách ke zdraví

[www.tehotenskytest.cz](http://www.tehotenskytest.cz) - kompletní informace o těhotenství a mateřství

[www.ivtimuno.cz](http://www.ivtimuno.cz)